

# 新型コロナワクチン接種後の健康状況調査を公開します。


同年代の方、チームなど団体の方へ参考になればと思います。

吉備国際大学シャルム岡山高梁では8/28までに2回目のワクチン接種をスタッフを含め全49名中、47名が完了致しました。1回目及び2回目のワクチン接種後の副反応について、アンケート調査を実施致しましたので公表致します。データは10代、20代、30代の女性に限り選手・スタッフです。尚、男性フロントスタッフ・コーチングスタッフの接種も完了しております。残りの2名は地域での接種(1名)、及び時期を見て接種検討(1名)となっています。

※アンケートは匿名かつ任意でのご提供をお願いしております。  
※ワクチンは全てファイザー社製の接種となっています。


## ① あなたの年齢は？

- 10代
- 20代
- 30代




## ② ワクチン1回目接種部位の腫脹はどれくらいでしたか？

- 全く腫れなかったか、軽度腫脹
- 痛みを伴って腫れたが、動作制限なし
- 痛みを伴い大きく腫れ、腕が動かさにくい
- 腕が動かさにくい
- 痛みがあり腕が動かさにくかったが腫れはなかった
- 腫れはないが痛みと動作制限あり




## ③ ワクチン2回目接種部位の腫脹はどれくらいでしたか？

- 全く腫れなかったか、軽度腫脹
- 痛みを伴って腫れたが、動作制限なし
- 痛みを伴い大きく腫れ、腕が動かさにくい
- 少し腫れて動かさにくい
- 腫れは無いが痛みと動作に制限あり




## ④ ワクチン2回目接種後の全身症状をお聞かせください。

- 発熱
- 倦怠感
- 筋肉痛
- 関節痛
- 頭痛
- 発熱、倦怠感、寒気、頭痛
- 症状 なし




## ⑤ 発熱があった方は最高何度の熱が出ましたか？

- 37.0~37.4℃
- 37.5~37.9℃
- 38.0~38.4℃
- 38.5~38.9℃
- 39.0℃ 以上




## ⑥ 発熱はワクチン接種後何時間後から始まりましたか？

- 12時間以内
- 12~23時間後
- 24時間以後




## ⑦ 発熱はワクチン接種後何時間後まで続きましたか？

- 5時間
- 10時間
- 24時間
- 36時間
- 48時間



## ⑧ 発熱以外の症状は、ワクチン接種後何時間後まで続きましたか？

- 24時間
- 36時間
- 48時間
- 48時間以上
- わからない



## ⑨ 医療機関に受診するほどの症状はありましたか？

- はい
- いいえ

